

English	Deutsch	Français	Italiano
Premeno® Duo Vaginal ovules	Premeno® Duo Vaginal-Ovulume	Premeno® Duo Ovules vaginaux	Premeno® Duo Ovuli vaginali
Application instructions (Please keep these instructions!)	Gebrauchshinweise (Bitte aufbewahren!)	Mode d'emploi (A conserver S.V.P.)	Istruzioni per l'uso (Conservare le presenti istruzioni!)
Composition: Sodium hyaluronate, lactic acid, sodium lactate	Zusammensetzung: Hyaluronsäure-Natrium, Milchsäure, Natriumlactat	Composition: Acide hyaluronique sodique, acide lactique, lactate de sodium	Composizione: Acido ialuronico sale sodico, acido lattico, lattato di sodio
Other ingredients: Fats, ceteareth, beeswax, sorbitan monostearate, macrogols	Sonstige Bestandteile: Fette, Ceteareth, Bienenwachs, Sorbitanmonostearat, Macrogole	Autres composantes: Graisses, ceteareth, cire d'abeille, monostéarate de sorbitane, macrogols	Recipienti: Grassi, ceteareth, cera d'api, sorbitano monostearato, macrogoli
General information: The moisture content, elasticity and acidity level of the vaginal epithelium (vaginal walls) are very finely regulated.	Allgemeine Informationen: Das Scheidenepithel (Scheidenwände) verfügt über eine sehr feine Regulierung der Feuchtigkeit, Elastizität und des Säurehaushaltes.	Informations générales: L'humidification, l'élasticité et l'acidité de l'épithélium vaginal (parois du vagin) sont régulées de manière très sensible.	Informazioni generali: L'epitelio vaginale (pareti vaginali) è caratterizzato da una regolazione ottimale dell'idratazione, dell'elasticità e del metabolismo degli acidi. In determinate situazioni, come per esempio
In certain situations, such as during or after the menopause, after childbirth, while breast feeding, when taking hormone preparations, in mental disturbances (stress), or after cancer treatment (chemotherapy) this regulating process can be altered or disturbed. As a result the vagina may become dry, and the acidic vaginal secretion is disturbed. Some common symptoms of this are: itching, burning, burning during sexual intercourse and a tendency to inflammation. Mechanical stimuli, and also intercourse, can cause small tears and injuries to the epithelium. If the normal level of lactic acid production is reduced, the chance of developing a vaginal infection, and thus vaginal inflammation (cervicitis) and a discharge with a distinct odour, is greatly increased.	In bestimmten Situationen, wie zum Beispiel während oder nach der Menopause, nach einer Entbindung, während der Stillzeit, bei Einnahme von Hormonpräparaten, bei psychischen Störungen (Stress), oder nach einer Krebsbehandlung (Chemotherapie) kann dieser Regulierungsprozess verändert oder gestört werden. Als Folgecheinung kann es zu einer trockenen Scheide und zu einer Störung des sauren Vaginalsekretes kommen. Es treten dann häufig Beschwerden auf wie: Jucken, Brennen, Brennen beim Geschlechtsverkehr und Neigung zu Entzündungen. Durch mechanische Reize, auch durch Geschlechtsverkehr, können kleine Risse und Verletzungen des Epithels auftreten. Kommt es zusätzlich auch noch zu einer Reduzierung der physiologischen Milchsäureproduktion, steigt die Anfälligkeit einer Scheideninfektion und damit einer Scheidenentzündung (Kolpitis) mit deutlich riechendem Ausfluss stark an.	Dans certaines situations, comme par exemple pendant ou après la ménopause, après une naissance, pendant un allaitement, lors de la prise de préparations hormonales, en cas de troubles psychiques (stress), ou après un traitement anticancéreux (chimiothérapie) ce processus de régulation peut être modifié ou perturbé. Une sécheresse vaginale ou une perturbation des sécrétions vaginales acides peut en résulter. Des symptômes apparaissent alors souvent comme des démangeaisons, des brûlures, des brûlures lors des rapports sexuels et une tendance à l'inflammation. Des irritations mécaniques, comme c'est le cas lors des rapports sexuels, peuvent entraîner des petites lésions épithéliales. En cas de diminution simultanée de la production d'acide lactique physiologique, la sensibilité aux infections et aux inflammations vaginales (cervicitis), accompagnées de pertes fortement odorantes, augmente significativamente.	durante o dopo la menopausa, dopo un parto, durante l'allattamento, in caso di assunzione di preparati ormonali, in caso di disturbi psichici (stress), oppure dopo una terapia antitumorale (chemioterapia) questo meccanismo di regolazione può subire alterazioni o danni in grado di causare seccchezza vaginale o alterazione delle secrezioni vaginali acide. In questi casi subentrano spesso disturbi come: prurito, bruciore, bruciore durante i rapporti sessuali e tendenze alla infiammazione. Eventuali stimoli meccanici, anche durante il rapporto sessuale, possono provocare piccole lacerazioni e lesioni dell'epitelio. Se questi sintomi sono accompagnati da una riduzione della produzione fisiologica di acido lattico, aumentano drasticamente le probabilità di un'inflammazione vaginale e quindi di un'infezione vaginale (vaginite) con perdite maleodoranti.
Premeno® Duo has a dual action, i. e. it aids the healing of two types of vaginal disorders at the same time:	The Wirkung von Premeno® Duo ist dual, d. h. die Heilung von zweierlei Vaginalstörungen wird gleichzeitig unterstützt:	L'effet de Premeno® Duo est double, c'est-à-dire que la guérison de deux troubles vaginaux est stimulée simultanément:	Premeno® Duo svolge una duplice azione, ovvero è in grado di favorire contemporaneamente la guarigione dei due tipi di disturbi vaginali:
- Hyaluronic acid: This is mainly responsible for the moisture and elasticity of the skin (mucous membranes). It also plays a vital part in healing processes and tissue repair.	- Die Hyaluronsäure: Sie ist hauptverantwortlich für die (Schleim-)Hautfeuchtigkeit und deren Elastizität. Außerdem ist sie intensiv an Heilungsprozessen und Gewebereparaturen beteiligt. Neuere Untersuchungen belegen auch die Wachstumshemmung von Candida albicans – der häufigste Erreger der Vaginalmykose (Scheidenpilz). Östrogenmangel hat in der Vaginalhaut zu einer Verringerung der Hyaluronsäure führen, wodurch die Feuchtigkeit, Elastizität und die Gewebebeständigkeit nachlässt.	- Acide hyaluronique: il est responsable de l'humidification de l'épithélium (muqueuse) et de son élasticité. En outre, il participe activement aux processus de guérison et aux réparations tissulaires. Des nouvelles études montrent également l'inhibition de la croissance de Candida albicans, le germe le plus souvent à l'origine des mycoses vaginales (champignon vaginal). Une carence en œstrogènes peut conduire à une diminution de l'acide hyaluronique, ce qui induit une réduction de l'humidification, de l'élasticité et de la stabilité tissulaire.	- Acido ialuronico: è il principale responsabile dell'idratazione dell'epitelio (muqueuse) e della sua elasticità. Partecipa inoltre attivamente ai processi di cicatrizzazione e riparazione dei tessuti. Studi recenti confermano anche la sua azione inibitoria nei confronti della Candida albicans – il più frequente agente patogeno della micosi vaginale (fungo vaginale).
Recent studies also show that it inhibits the growth of Candida albicans – the most common cause of vaginal mycosis (fungal infection of the vagina).	- Die Kombination Milchsäure/Natriumlactat: Zahlreiche Faktoren, u. a. Oestrogenmangel oder Blutungen können das natürlich-saure Scheidenmilieu ungünstig beeinflussen. In der Folge kann es zu einer Überwucherung durch schädliche Bakterien oder Keimen kommen. Die Milchsäure/Natriumlactat Kombination stellt den Scheiden-pH wieder auf den natürlichen Wert von 3,8 bis 4,5 ein und sorgt so für ein verringertes Infektionsrisiko.	- Association acide lactique / lactate de sodium: de nombreux facteurs, dont la carence en œstrogènes ou des saignements, peuvent influencer de manière désavantageuse le milieu naturellement acide du vagin. Il peut en résulter une multiplication de bactéries ou de germes nocifs. L'association acide lactique/lactate de sodium permet de restaurer le pH vaginal à sa valeur naturelle (3,8 à 4,5) et assure ainsi une diminution du risque d'infection.	La carenza di estrogeni può produrre un calo dei livelli di acido ialuronico nella mucosa vaginale con la conseguente riduzione di idratazione, elasticità e stabilità dei tessuti.
Lack of oestrogen can cause levels of hyaluronic acid in the vaginal skin to fall, which reduces moisture, elasticity and the stability of the tissue.	- Die Kombination Milchsäure/Natriumlactat: Zahlreiche Faktoren, u. a. Oestrogenmangel oder Blutungen können das natürlich-saure Scheidenmilieu ungünstig beeinflussen. In der Folge kann es zu einer Überwucherung durch schädliche Bakterien oder Keimen kommen. Die Milchsäure/Natriumlactat Kombination stellt den Scheiden-pH wieder auf den natürlichen Wert von 3,8 bis 4,5 ein und sorgt so für ein verringertes Infektionsrisiko.	Ces principes actifs sont des substances apparentées à celles du corps humain et présentent donc un risque d'effets indésirables très faible.	- Associazione di acido lattico e lattato di sodio: numerosi fattori, tra cui la carenza di estrogeni o le emorragie, possono influenzare negativamente l'ambiente naturalmente acido della vagina, con la conseguenza di una possibile proliferazione di batteri o germi nocivi.
- The combination lactic acid/sodium lactate: Numerous factors, including lack of oestrogen or bleeding can have a negative effect on the naturally acid vaginal environment. This can cause an overgrowth of harmful bacteria or germs. The lactic acid/sodium lactate combination restores the vaginal-pH to the natural level of 3.8 to 4.5 and thus ensures that the risk of infection is decreased.	- Die Kombination Milchsäure/Natriumlactat: Zahlreiche Faktoren, u. a. Oestrogenmangel oder Blutungen können das natürlich-saure Scheidenmilieu ungünstig beeinflussen. In der Folge kann es zu einer Überwucherung durch schädliche Bakterien oder Keimen kommen. Die Milchsäure/Natriumlactat Kombination stellt den Scheiden-pH wieder auf den natürlichen Wert von 3,8 bis 4,5 ein und sorgt so für ein verringertes Infektionsrisiko.	Les ovules sont incolores et inodores, faciles à utiliser et indiqués pour une utilisation préventive et/ou thérapeutique régulière, jusqu'à une fois par jour.	L'associazione di acido lattico e lattato di sodio ripristina il valore naturale del pH vaginale di 3,8-4,5 riducendo così il rischio di infezione.
The active substances are biocompatible substances and therefore have a very low risk of side effects.	Premeno® Duo enthält keine Hormone.	Premeno® Duo ne contient pas d'hormone.	I principi attivi sono sostanze endogene e comportano quindi un rischio di effetti collaterali molto ridotto.
The ovules are colourant and fragrance free and are simple to use. They can be inserted regularly, up to once daily, for preventive or therapeutic use.	Indication: - Premeno® Duo are vaginal ovules for the treatment of vaginal dryness, caused by e. g. the menopause, stress, breast feeding or antihormonal chemotherapy, with or without local hormone therapy. Supports healing processes in damaged vaginal epithelium.	Indications: - Premeno® Duo sont des ovules vaginaux pour le traitement de la sécheresse vaginale due, par exemple, à la ménopause, au stress, à l'allaitement ou à une chimiothérapie anti-hormonale avec ou sans traitement hormonal local. Renforce le processus de guérison de l'épithélium vaginal endommagé.	Indicazioni: - Le suppose vaginali Premeno® Duo sono indicate per il trattamento della seccchezza vaginale dovuta a menopausa, stress, allattamento, chemioterapia antiormonale, con o senza terapia ormonale locale. Supporto dei processi di cicatrizzazione dell'epitelio vaginale danneggiato.
Premeno® Duo does not contain any hormones.	Instructions for use: Application of 1x daily to 1x every 3rd day has proven to be effective for the prevention and treatment of dry vaginal epithelium.	Instructions for use: Pour la prévention et le traitement de la sécheresse de l'épithélium vaginal, l'utilisation une fois par jour jusqu'à une fois tous les trois jours s'est avérée efficace.	Indicazioni: - Le suppose vaginali Premeno® Duo sono indicate per il trattamento della seccchezza vaginale dovuta a menopausa, stress, allattamento, chemioterapia antiormonale, con o senza terapia ormonale locale. Supporto dei processi di cicatrizzazione dell'epitelio vaginale danneggiato.
Initial therapy: Insert one ovule in the evening before bedtime over a period of 10 consecutive days.	Instructions for use: Vorbeugende Behandlung einer Kolpitis (Scheideninfektion) und von Vaginalmykosen (Scheidenpilz).	Instructions for use: L'introduction de l'ovule dans le vagin est facile. L'ovule est introduit avec un doigt le plus profondément possible dans le vagin puis fond complètement en quelques minutes.	Indicazioni: - Riduce il rischio di lacerazioni dovute ad azioni meccaniche e quindi l'insorgenza di infezioni batteriche. L'applicazione ripetuta garantisce una lubrificazione vaginale sufficiente e duratura che può migliorare al tempo stesso la sensibilità sessuale.
Maintenance therapy: For a lasting effect you should insert 1 ovule every 3rd day, for as long as you feel this is desirable.	Instructions for use: Initialtherapie: Über einen Zeitraum von 10 aufeinander folgenden Tagen 1 Zäpfchen abends vor dem Schlafengehen einführen.	Instructions for use: Pour la prévention et le traitement de la sécheresse de l'épithélium vaginal, l'utilisation une fois par jour jusqu'à une fois tous les trois jours s'est avérée efficace.	Indicazioni: - Miglioramento delle difese contro le infezioni: trattamento preventivo delle cervicitis (infezioni vaginali) e delle mycoses vaginali (infezioni vaginali per i champignons).
Tips for use:	Instructions for use: Erhaltungstherapie: Für eine anhaltende Wirkung sollten Sie, so lange Sie dies als wünschenswert erachten, nach der Initialtherapie 1 Zäpfchen jeden 3. Tag einführen.	Instructions for use: L'introduction de l'ovule dans le vagin est facile. L'ovule est introduit avec un doigt le plus profondément possible dans le vagin puis fond complètement en quelques minutes.	Indicazioni: - L'insorgenza di infezioni batteriche. L'applicazione ripetuta garantisce una lubrificazione vaginale sufficiente e duratura che può migliorare al tempo stesso la sensibilità sessuale.
Vaginal moistness may be greatly increased in isolated cases; wearing a panty liner is therefore recommended. If the vaginal wall is very sensitive, the ovule can be inserted more easily if it is briefly held under warm water before insertion.	Instructions for use: Nach Ablauf des Verfallsdatums (s. Verpackungsaufdruck) darf Premeno® Duo nicht mehr angewendet werden.	Instructions for use: Premeno® Duo ne doit pas être utilisé après la date de péremption (voir l'emballage).	Indicazioni: - Suggerimenti per l'uso:
Contraindications: Medical supervision is recommended if the ovules are used in acute or severe vaginal infections.	Instructions for use: Bei vaginaler Trockenheit als Folge eines Oestrogenmangels während oder nach den Wechseljahren:	Instructions for use: En cas de sécheresse vaginale consécutive à une carence en œstrogènes pendant ou après la ménopause:	Contraindication: In caso di infezioni vaginali gravi o acute, è necessario utilizzare il prodotto sotto controllo medico.
The product should not be used in known hypersensitivity to individual ingredients.	Instructions for use: Initialtherapie: Über einen Zeitraum von 10 aufeinander folgenden Tagen 1 Zäpfchen abends vor dem Schlafengehen einführen.	Instructions for use: Traitement initial: introduire un ovule le soir avant le coucheur pendant 10 jours consécutifs. Traitement d'entretien: vous devez, pour une efficacité durable, introduire un ovule tous les trois jours aussi longtemps que vous le jugez nécessaire après le traitement initial.	Confronti con altri prodotti: In caso di ipersensibilità nota nei confronti di singoli componenti, evitare l'uso del prodotto.
Risks for the unborn child are unknown, but due to a lack of research, application during pregnancy cannot be recommended.	Instructions for use: Erhaltungstherapie: Für eine anhaltende Wirkung sollten Sie, so lange Sie dies als wünschenswert erachten, nach der Initialtherapie 1 Zäpfchen jeden 3. Tag einführen.	Instructions for use: Conseils pour l'utilisation: La formation d'un humidité pouvant éventuellement être accrue, il est recommandé de porter un protège-slip. Si la paroi vaginale est très sensible, l'introduction de l'ovule peut être facilitée si on le passe auparavant rapidement sous l'eau chaude.	Confronti con altri prodotti: Non sono noti rischi per il feto, ma data la mancanza di studi sul tema non è possibile consigliare l'uso del prodotto in gravidanza.
Since the ovules base contains modified natural fats, condoms or diaphragms made from natural latex should not be used at the same time as Premeno® Duo.	Instructions for use: Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber einzelnen Bestandteilen sollte das Produkt nicht angewendet werden.	Instructions for use: Conseils pour l'utilisation: La formation d'un humidité pouvant éventuellement être accrue, il est recommandé de porter un protège-slip. Si la paroi vaginale est très sensible, l'introduction de l'ovule peut être facilitée si on le passe auparavant rapidement sous l'eau chaude.	Effetti collaterali: Dal momento che i componenti base delle supposte contengono grassi naturali modificati, non è indicato l'uso di preservativi e diaframma in lattice in concomitanza con Premeno® Duo.
Side effects: Since the ovules contain lactic acid, mild skin reactions (mild burning or itching) may occur in rare cases, particularly if the vaginal epithelium is very dry and/or damaged. These usually disappear within a short period.	Instructions for use: Es sind keine Risiken für das ungeborene Kind bekannt, aber aufgrund fehlender Untersuchungen kann eine Anwendung während der Schwangerschaft nicht empfohlen werden.	Instructions for use: Les ovules contiennent des graisses naturellement modifiées, l'utilisation de préservatifs et de diaframma in lattice naturel simultanément avec Premeno® Duo est contre-indiquée.	Effetti collaterali: A causa del contenuto di acido lattico, in casi rari, soprattutto in presenza di epitelio vaginale molto secco e/o danneggiato, possono verificarsi leggere reazioni cutanee (legre sensazioni di brûlure ou de démangeaison). Ces effets disparaissent la plupart du temps rapidement.
Storage instructions: Store Premeno® Duo in a dry place at 4 °C to 25 °C and protected from light.	Instructions for use: Da die Zäpfchengrundlage abgewandelte natürliche Fette enthalten, dürfen Kontröle oder Diaphragmen aus Naturlatex nicht gleichzeitig mit Premeno® Duo verwendet werden.	Instructions for use: Effets indésirables: Dans de rares cas, l'acide lactique contenu dans les ovules peut, particulièrement en cas de sécheresse très marquée et/ou de lésions de l'épithélium vaginal, induire de légères réactions cutanées (légers sensations de brûlure ou de démangeaison). Ces effets disparaissent la plupart du temps rapidement.	Istruzioni per la conservazione: Per la prevenzione e il trattamento della seccchezza dell'epitelio vaginale si è dimostrata efficace una posologia da 1 ovulo al giorno a 1 ovulo ogni 3 giorni.
Pack size: 10 vaginal ovules of 2g	Instructions for use: Gegenanzeigen: Bei akuten oder schweren vaginalen Infektionen ist die Anwendung unter ärztlicher Kontrolle zu empfehlen.	Instructions for use: Istruzioni per la conservazione: Conservare Premeno® Duo in un luogo asciutto (da 4 °C a 25 °C) e al riparo dalla luce.	Istruzioni per la conservazione: Conservare Premeno® Duo in un luogo asciutto (da 4 °C a 25 °C) e al riparo dalla luce.
Made in Germany PZN 06078411 EAN 401327350012	Distribution / Vertrieb / Distributeur / Distributore: KESSEL medintim GmbH Kellerbacher Str. 28 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany tel.: +49 (0) 6105 20 37 20 / fax: +49 (0) 6105 455 901 email: service@medintim.com / www.medintim.com	Dimensions della confezione: 10 supposte vaginali da 2g	10 supposte vaginali da 2g

Key / Legende / Légende / Legenda:

LOT Batch number / Chargenbezeichnung / Numéro de lot / Codice lotto

i Read the instructions for use / Lire les instructions pour l'usage / Leggere le istruzioni per l'uso

Manufacture date / Herstellungsdatum / Date de fabrication / Data di produzione

Expiry date / Verwendbar bis / Utilisable jusqu'à / Utilizzabile entro

4°C Empfohlene Lagertemperatur / Temperatura di conservazione consigliata / Temperatura di conservazione consigliata

**(بريمينو الثنائي) (ليوس مهيل)
ارشادات الاستخدام**

المكونات: هلورونيك الصوديوم ، حمض اللبنيك ، لينات الصوديوم ، لينات الصوديوم ، مكونات أخرى : دهن ، سباتريل ، سريتيون مونو سترات . العسل ، سريتيون مونو سترات . معلومات عامة: ينبع جدار المهيل بخاصية حساسة لتنفسه ، الرطوبة ، المرنة و الخاص الحموضة . ولكن في بعض الحالات على سبيل المثال :

- اثناء او بعد انقطاع الحيض .

- بعد الولاد .

- اثناء النضاعة .

- تناول الادوية التي تحتوي على هرمونات .

- الانظارات النسائية والاجهاض .

- عند بدء العلاج الكيميائي .

يحدث تغير في عملية التغذية هذه والتي تؤدي الى الى جانب المهميل ، والتي تؤدي بدورها الى :

- الحكة الشديدة ، الشعور بالحرقة اثناء المجماع .

والعمل لحوث التباينات مهيل ، وقد تحدث بعض الارجح والدواء على الحد من افراز انتاج حمض البنيك الهام .

و بذلك تزكي مهيلاته للتغذية للعدوى المهيلية .

و حدوث الانفلامات وانبعاث الراتخ الغير

نظير فاعلية بريمينو الثنائي (Premeno) .

بطربيه مزيجه وذلك من خلال :

- حمض الالوريونيك والمسول بالرذق حمض الالوريونيك والمسول بالرذق .

الأولى عن رطوبة الجلد ومرنته ، على ذلك يساهم بشكل فعال في عملية العلاج رعاية

بناء الأنسجة .

فطريات الم belum يمكن ان تؤدي الى نقص

الاستروجين والتالي تؤدي لانخفاض حمض

الالوريونيك في غشاء المهيل ويساهم في تقليل

الارطوبة واسقرار الانفاس .

2 المزج بين حمض اللبنيك - لينات

الصوديوم .

نقص الستروجين او التزيف يؤثر سلبيا على

لبنيه الوسط المهبلي والتالي تؤديها يمكن ان

تساعد على انتشار المكتريكا والجراثيم الضارة .

ذالك تزكي المزج بين حمض اللبنيك ولينات

الهدروجيني الطبيعي (4.5-3.8) (ضممان

الحد من الدوى .

لوباس بريمينو الثنائي عدمية اللون والرائحة

لذا يمكن استخدام بشكل منتظم لمره واحد

بومبا ينافر الوقاية والعلاج .

بريمينو الثنائي لا تصنف اى هرمونات .

ملاحظات:

بريمينو الثنائي هو ليوس مهيل لعلاج حفاف

المهيل الناجم عن انقطاع الحبيب ، الاجهاض ،

الرضاعه او العلاج الكيميائي .

ايضا يعمل على تقليل من خطر التشقق الناجم

عن التباينات المهبليه وبالتالي التعرض

للعدوى المكتريكا . ويكثار استخدامه بشكل

دام يسمح بتناول الارطوبة المناسبة والشعر

المناسب والسلام تحسين المتابعة ضد العوى من

خلال الحجاج الوقائي من الدوى والطفريات

المهيلي .

تليميات الاستخدام:

للتوكيل والعلاج والعلاج المهبلي يستخدم مرره

بومبا مده ثالث أيام .

يتم ادخال اللوباس المهيل بالشكل خال

بضم مقاييس .

لا يجب استخدام الدواء بعد انقضاء فترة

الصلحية والطاهر والغير .

في حالة الحفاف المهبلي تتجاهل نقص

الستروجين اثناء او بعد انقطاع الحبيب يتم

الاتار الجلدية:

في بعض الحالات النادرة وليس تواجه حمض

اللبنيك يمكن حدوث حرقة حقيقه او حكه .

يقطف الدواء بعدد عن الضوء وفي مكان جاف

تحت درجه حرارة 25-4 درجه منويه .

حج الماء:

10 لوباس مهيل وزن الواحد 2 جرام .

الصنف:

شركه تاميدا محدوده

DeltaMed GmbH, Raiffeisenstr. 8a,

61169 Friedberg, Germany

Español

Português

ελληνικά

Premeno® Duo

Óvulo vaginal

Instrucciones de uso (Por favor, guardar para consultas posteriores)

Composición: Hialuronato de sodio, ácido láctico, lactato de sodio.

Otros componentes: Grasas, ceteareta, cera de abeja, monoestearato de sorbitano, macrogolos.

Información general: El epitelio vaginal (paredes vaginales) posee una regulación muy precisa de la humedad, la elasticidad y la cantidad de ácido. En determinadas situaciones, como por ejemplo durante o después de la menopausia, después de un parto, durante la lactancia, durante la toma de preparados hormonales en periodo de sobrecarga psíquica (estrés), o después de un tratamiento de cáncer (quimioterapia) este proceso auto-regulador puede verse modificado o anulado. Como consecuencia puede aparecer sequedad vaginal o una alteración en la secreción ácida vaginal. Esto puede provocar molestias como: picor, ardor, ardor durante las relaciones sexuales y tendencia a sufrir inflamaciones. Los estímulos mecánicos, también los producidos por las relaciones sexuales, pueden causar pequeños desgarros y lesiones en el epitelio. Si, además, se produce una reducción de la producción fisiológica del ácido láctico aumenta la propensión a sufrir una infección vaginal y, con ella, una inflamación vaginal (colitis) con un flujo de olor notablemente fuerte.

El efecto de Premeno® Duo es doble, es decir, fomenta la curación de dos problemas vaginales:

- **El ácido hialurónico:** es el principal responsable de la humedad tisular (vaginal) y de su elasticidad. Además participa de modo intenso en los procesos de cicatrización y las reparaciones del tejido. Los últimos estudios demuestran también su potencial inhibidor del crecimiento del Candida albicans; el patógeno más frecuente de la micosis vaginal (hongo vaginal). La deficiencia de estrógenos en el epitelio vaginal puede provocar una disminución del ácido hialurónico, lo que provoca la reducción de la humedad, la elasticidad y la estabilidad del tejido.

- **La combinación ácido láctico/lactato de sodio:** Numerosos factores, como la falta de estrógenos o las hemorragias, pueden influir negativamente sobre el medio natural ácido de la vagina. Como consecuencia puede producirse un sobrecrecimiento de bacterias o gérmenes patógenos. La combinación de ácido láctico/lactato de sodio restablece el pH vaginal a su valor natural de 3,8 a 4,5 y reduce así el riesgo de infecciones.

Las sustancias activas son sustancias similares a las corporales, por eso su grado de efectos secundarios es mínimo.

El óvulo, incoloro y de olor neutro, es fácil de usar y puede introducirse como una aplicación preventiva y/o terapéutica de forma regular hasta una vez al día.

Premeno® Duo no contiene hormonas.

Indicación:

- Premeno® Duo son pequeños supositorios vaginales para el tratamiento complementario de la sequedad vaginal provocada, p.ej., por la menopausia, el estrés, la lactancia o la quimioterapia antihormonal, con o sin tratamiento hormonal local.

Premeno® Duo ayuda en los procesos de cicatrización del epitelio vaginal dañado.

- Reduce el riesgo de desgarros provocados por efectos mecánicos y, con ello, la aparición de infecciones bacterianas. Su uso continuo garantiza de forma duradera una humedad suficiente de la vagina, mejorando nuevamente las sensaciones sexuales.

- Mejora la defensa contra infecciones: Tratamiento preventivo de colpitis (infección vaginal) y de micosis vaginal (hongo vaginal).

Indicaciones de uso:

Para la prevención y el tratamiento del epitelio vaginal seco es necesaria una aplicación desde 1 vez al dia hasta 1 vez cada 3 días. La introducción del supositorio en la vagina es sencilla. El supositorio debe ser introducido en la vagina con los dedos lo mas profundamente posible. Una vez dentro, se derrite completamente en pocos minutos. No utilizar Premeno® Duo si se ha superado la fecha de caducidad (v. impresión del envase).

- En caso de sequedad vaginal como consecuencia de una falta de estrógenos durante o después de la menopausia:

Tratamiento inicial: durante un periodo de 10 días consecutivos utilizar 1 óvulo diariamente a noche , antes de dormir.

Tratamiento de manutención: para un efecto duradero, após tratamiento inicial, enquanto considerar conveniente, deverá utilizar um óvulo de 3 em 3 dias.

Conselhos para utilização: Dado que pode ocorrer ocasionalmente uma maior produção de humidade, recomenda-se a utilização de pesos de uso diário.

A fim de facilitar a inserção do óvulo em caso de maior sensibilidade da parede vaginal, pode molhar-se o óvulo brevemente em água morna corrente com o Premeno® Duo após o fim da validade ter expirado (ver na embalagem).

- Em caso de sequera vaginal como consequencia de falta de estrógenos durante o após a menopausa:

Tratamento inicial: durante um periodo de 10 dias consecutivos, utilizar 1 óvulo diariamente a noite , antes de dormir.

Tratamento de manutenção: para um efecto duradouro, após tratamento inicial, enquanto considerar conveniente, deverá utilizar um óvulo de 3 em 3 dias.

Conselhos para utilização: Dado que pode ocorrer ocasionalmente uma maior produção de humidade, recomenda-se a utilização de pesos de uso diário.

A fim de facilitar a inserção do óvulo em caso de maior sensibilidade da parede vaginal, pode molhar-se o óvulo brevemente em água morna corrente com o Premeno® Duo.

Efeitos adversos: Devido ao ácido láctico contido no produto, em casos raros podem ocorrer irritações cutâneas leigeras (ardor leigero ou prurido), sobretudo quando o epitelio vaginal se encontra muito seco e/ou lesado. Na maioria dos casos, estes efeitos desaparecem a curto prazo.

Instruções para armazenamento: Premeno® Duo deve ser armazenado ao abrigo da luz e da humidade a uma temperatura de 4°C a 25°C.

Apresentação: 10 óvulos vaginais de 2g

Premeno® Duo

Óvulos vaginais

Instruções de uso

(Guardar por favor)

Composição: Sal sódico do ácido hialurônico, ácido láctico, lactato de sódio.

Outros ingredientes: Gorduras, ceteareta, cera de abeja, monoestearato de sorbitano, macrogolos.

Informações gerais: O epitelio vaginal (as paredes da vagina) dispõe de uma regulação muito precisa da hidratação, da elasticidade e do equilíbrio de ácidos.

Em determinadas situações como durante ou após a menopausa, após o parto, durante a amamentação, em caso de ingestão de preparações hormonais, em caso de distúrbios psíquicos (estres), ou depois de um tratamento de doença cancerígena (quimioterapia)

este processo auto-regulador pode ser alterado ou perturbado. Como consequência, pode ocorrer sequera vaginal e um desequilíbrio da secreção ácida da vagina. Os sintomas que dali resultam mais frequentemente incluem prurido, ardor, ardor durante as relações sexuais e propensão a inflamações. Os estímulos mecânicos, também os producidos por

as relações性es, podem causar pequenos desgarros e lesões em elas. Se estas se associar ainda uma produção fisiológica reduzida de ácido láctico, aumenta

fortemente a propensão a infecções vaginais (vaginitis) acompanhadas de corrimento com mau odor.

O efeito de Premeno® Duo é duplo, isto é, ajuda na recuperação de duas afecções vaginais em simultâneo:

- **O ácido hialurônico:** é responsável pela hidratação da pele (e mucosa) e pela sua elasticidade. Além disso, contribui fortemente para a recuperação e reparação dos tecidos. Estudos mais recentes comprovam também a sua capacidade inhibitoria do crescimento de *Candida albicans* – o agente causador mais comum da micose vaginal (fungos vaginais). A falta de estrógenos pode provocar uma diminuição do ácido hialurônico da mucosa vaginal, o que faz diminuir a hidratação, a elasticidade e a estabilidade tecidual.

- **A combinação de ácido láctico com lactato de sódio:** muitos factores, tal como, a falta de estrógenos ou as hemorragias (menstruação), podem influenciar negativamente o meio naturalmente ácido da vagina. Como consequência, pode ocorrer uma proliferação de bactérias ou microorganismos patogénicos. A combinação de ácido láctico com lactato de sódio devolve à vagina o seu pH natural de 3,8 a 4,5, reduzindo assim o risco de infecção.

Os componentes ativos são substâncias biocompatíveis e, por isso, o risco de efeitos secundários é muito reduzido.

O óvulo incolor e inodoro é fácil

de utilizar e pode ser introduzido regularmente, ou no máximo uma vez

por dia, para fins profiláticos e/ou terapêuticos.

Premeno® Duo não contém hormonas.

Indicaciones:

- Premeno® Duo são óvulos vaginais que se destinam ao tratamento da sequera vaginal devido a, por ex., menopausa, stress, amamentação ou quimioterapia anti-hormonal, com ou sem hormonoterapia local.

Favorece os processos de recuperacao do epitelio vaginal lesado.

- Reduz o risco de fissuras devido a estímulos mecânicos e a relações sexuais e, por conseguinte, o aparecimento de infecções bacterianas. Quando aplicado repetidamente, promove uma hidratação vaginal suficiente e duradoura, o que faz melhorar ao mesmo tempo a sensação sexual.

- Aumenta a defesa contra as infecções: tratamento profilático da vaginitis (infecção vaginal) e das micoses vaginais (fungos).

Informações de uso: Para prevenção e tratamento eficaz do epitelio vaginal seco, aplicar 1 óvulo por dia até 1 óvulo em três dias. A introdução do óvulo na vagina é fácil. Deve ser inserido o mais profundamente possível na vagina com o auxilio de um dedo, onde se dissolve completamente ao fim de alguns minutos. Não utilizar Premeno® Duo após o fim do prazo de validade ter expirado (ver na embalagem).

- Em caso de sequera vaginal como consequencia de falta de estrógenos durante o após a menopausa:

Tratamento inicial: durante um periodo de 10 dias consecutivos, utilizar 1 óvulo diariamente a noite , antes de dormir.

Tratamento de manutenção: para um efecto duradouro, após tratamento inicial, enquanto considerar conveniente, deverá utilizar um óvulo de 3 em 3 dias.

Conselhos para utilização: Dado que pode ocorrer ocasionalmente uma maior produção de humidade, recomenda-se a utilização de pesos de uso diário.

A fim de facilitar a inserção do óvulo em caso de maior sensibilidade da parede vaginal, pode molhar-se o óvulo brevemente em água morna corrente com o Premeno® Duo após o fim da validade ter expirado (ver na embalagem).

- En caso de sequera vaginal como consequencia de falta de estrógenos durante o após a menopausa:

Tratamento inicial: durante um periodo de 10 dias consecutivos, utilizar 1 óvulo diariamente a noite , antes de dormir.

Tratamento de manutenção: para um efecto duradouro, após tratamento inicial, enquanto considerar conveniente, deverá utilizar um óvulo de 3 em 3 dias.

Conselhos para utilização: Dado que pode ocorrer ocasionalmente uma maior produção de humidade, recomenda-se a utilização de pesos de uso diário.

A fim de facilitar a inserção do óvulo em caso de maior sensibilidade da parede vaginal, pode molhar-se o óvulo brevemente em água morna corrente com o Premeno® Duo.

Efeitos adversos: Devido ao ácido láctico contido no produto, em casos raros podem ocorrer irritações cutâneas leigeras (ardor leigero ou prurido), sobretudo quando o epitelio vaginal se encontra muito seco e/ou lesado. Na maioria dos casos, estes efeitos desaparecem a curto prazo.

Instruções para armazenamento: Premeno® Duo deve ser armazenado ao abrigo da luz e da humidade a uma temperatura de 4°C a 25°C.

Apresentação: 10 óvulos vaginais de 2g

Premeno® Duo

Óvulos vaginais

Instruções de uso

Composição: Sal sódico do ácido hialurônico, ácido láctico, lactato de sódio.

Outros ingredientes: Gorduras, ceteareta, cera de abeja, monoestearato de sorbitano, macrogolos.

Informações gerais: O epitelio vaginal (as paredes da vagina) dispõe de uma regulação muito precisa da hidratação, da elasticidade e do equilíbrio de ácidos.

Em determinadas situações como durante ou após a menopausa, após o parto, durante a amamentação ou de sobrecarga psíquica (estres), ou depois de um tratamento de doença cancerígena (quimioterapia)

este processo auto-regulador pode ser alterado ou perturbado. Como consequência, pode ocorrer sequera vaginal e um desequilíbrio da secreção ácida da vagina. Os sintomas que dali resultam mais frequentemente incluem prurido, ardor, ardor durante as relações sexuais e propensão a inflamações. Os estímulos mecânicos, também os producidos por

as relações性es, podem causar pequenos desgarros e lesões em elas. Se estas se associar ainda uma produção fisiológica reduzida de

ácido hialurônico, aumenta

fortemente a propensão a infecções vaginais (vaginitis) acompanhadas de corrimento com mau odor.

O efeito de Premeno® Duo é duplo, isto é, ajuda na recuperação de duas afecções vaginais em simultâneo:

- **O ácido hialurônico:** é responsável pela hidratação da pele (e mucosa) e pela sua elasticidade. Além disso, contribui fortemente para a recuperação e reparação dos tecidos. Estudos mais recentes comprovam também a sua capacidade inhibitoria do crescimento de

Candida albicans – o agente causador mais comum da micose vaginal (fungos vaginais).

A falta de estrógenos pode provocar uma diminuição do ácido hialurônico da mucosa vaginal, o que faz diminuir a hidratação, a elasticidade e a estabilidade tecidual.

Como consequência, pode ocorrer sequera vaginal e um desequilíbrio da secreção ácida da vagina. Os sintomas que dali resultam mais frequentemente incluem prurido, ardor, ardor durante as relações sexuais e propensão a inflamações. Os estímulos mecânicos, também os producidos por

as relações性es, podem causar pequenos desgarros e lesões em elas. Se estas se associar ainda uma produção fisiológica reduzida de

ácido hialurônico, aumenta

fortemente a propensão a infecções vaginais (vaginitis) acompanhadas de corrimento com mau odor.

O efeito de Premeno® Duo é duplo, isto é, ajuda na recuperação de duas afecções vaginais em simultâneo:

- **O ácido hialurônico:** é responsável pela hidratação da pele (e mucosa) e pela sua elasticidade. Além disso, contribui fortemente para a recuperação e reparação dos tecidos. Estudos mais recentes comprovam também a sua capacidade inhibitoria do crescimento de

Candida albicans – o agente causador mais comum da micose vaginal (fungos vaginais).

A falta de estrógenos pode provocar uma diminuição do ácido hialurônico da mucosa vaginal, o que faz diminuir a hidratação, a elasticidade e a estabilidade tecidual.

Como consequência, pode ocorrer sequera vaginal e um desequilíbrio da secreção ácida da vagina. Os sintomas que dali resultam mais frequentemente incluem prurido, ardor, ardor durante as relações sexuais e propensão a inflamações. Os estímulos mecânicos, também os producidos por

as relações性es, podem causar pequenos desgarros e lesões em elas. Se estas se associar ainda uma produção fisiológica reduzida de

ácido hialurônico, aumenta

fortemente a propensão a infecções vaginais (vaginitis) acompanhadas de corrimento com mau odor.

O efeito de Premeno® Duo é duplo, isto é, ajuda na recuperação de duas afecções vaginais em simultâneo:

- **O ácido hialurônico:** é responsável pela hidratação da pele (e mucosa) e pela sua elasticidade. Além disso, contribui fortemente para a recuperação e reparação dos tecidos. Estudos mais recentes comprovam também a sua capacidade inhibitoria do crescimento de

Candida albicans – o agente causador mais comum da micose vaginal (fungos vaginais).

A falta de estrógenos pode provocar uma diminuição do ácido hialurônico da mucosa vaginal, o que faz diminuir a hidratação, a elasticidade e a estabilidade tecidual.

Como consequência, pode ocorrer sequera vaginal e um desequilíbrio da secreção ácida da vagina. Os sintomas que dali resultam mais frequentemente incluem prurido, ardor, ardor durante as relações sexuais e propensão a inflamações. Os estímulos mecânicos, também os producidos por

as relações性es, podem causar pequenos desgarros e lesões em elas. Se estas se associar ainda uma produção fisiológica reduzida de